

INFORMATIONS THÉRAPEUTIQUES



DÉPISTAGE DES CARDIOPATHIES À LA MATERNITÉ

PÔLE FEMME-ENFANT
SERVICE DE PÉDIATRIE • FILIÈRE NÉONATALOGIE

POUR VOTRE INFORMATION

Votre enfant va bénéficier d'un dépistage des cardiopathies à la maternité.

Celui-ci intervient en complément de l'examen du pédiatre.

QU'EST-CE QUE LES CARDIOPATHIES CONGÉNITALES ?

La cardiopathie congénitale est une maladie qui survient lorsque le cœur ou les principaux vaisseaux sanguins ne se sont pas formés correctement. C'est la **première malformation congénitale** présente dès la naissance. Il existe plusieurs cardiopathies congénitales (atrésie pulmonaire, sténose de l'artère pulmonaire, transposition des gros vaisseaux...) allant de la plus simple sans complication pour l'enfant aux très complexes, graves et parfois incompatibles avec la vie.

POURQUOI RÉALISER UN DÉPISTAGE ?

Si les cardiopathies congénitales sont détectées trop tard, il y a des **risques de complication très grave dès les premiers jours** ou semaines de vie, ce qui nécessite des soins d'urgence (seulement 50 % des cardiopathies sont détectées en anténatal). Bien que la plupart des nouveau-nés n'ait pas de problème cardiaque, **un dépistage précoce et rapide est essentiel à un traitement efficace.**

COMMENT EST RÉALISÉ LE DÉPISTAGE ?

Le dépistage des cardiopathies congénitales s'effectue par un **test rapide, non douloureux, appelé oxymétrie de pouls** qui mesure la saturation en oxygène dans le sang du bébé. Un petit appareil est utilisé pour prendre une mesure sur la main droite suivie d'une mesure sur un des pieds de votre bébé.

Ce test se fait en chambre lorsque l'enfant est calme et les résultats sont disponibles immédiatement.

QUAND FAIRE LE DÉPISTAGE ?

Le test est effectué 24 heures après la naissance et ne prend que quelques minutes.

PAR QUI EST RÉALISÉ LE DÉPISTAGE ?

Le test est réalisé par les auxiliaires de puériculture ou les puéricultrices.

QUE SE PASSE-T-IL SI MON BÉBÉ A UN RÉSULTAT DE DÉPISTAGE POSITIF ?

Un résultat de dépistage positif ne signifie pas que votre bébé est atteint d'une cardiopathie congénitale, mais qu'une évaluation plus approfondie est nécessaire pour déterminer la cause du faible taux d'oxygène.



PÔLE FEMME-ENFANT

SERVICE DE PÉDIATRIE • FILIÈRE NÉONATOLOGIE



HÔPITAL SUD

16 boulevard de Bulgarie • 35203 Rennes cedex 2